



g
S



Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG
Γυναικολόγος Αναπαραγωγής – Μαιευτήρας


Υστεροσαλπιγγογραφία

Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι στην ουσία μια ακτινογραφία της μήτρας και των σαλπίγγων. Πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι σάλπιγγες μιας γυναίκας είναι διαβατές και αν η κοιλότητα της μήτρας είναι φυσιολογική.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Ο ιατρός που εκτελεί την εξέταση τοποθετεί στην είσοδο του τραχήλου της μήτρας ένα πολύ λεπτό σωλήνα από όπου εγχέεται μέσα στη μήτρα ένα ειδικό υγρό (σκιαγραφική ουσία). Η σκιαγραφική ουσία προχωρά από τη μήτρα προς τις σάλπιγγες και όλη η πορεία του υγρού παρατηρείται μέσω μιας οθόνης ακτινοσκοπήσεων. Συνήθως καθώς προχωρά το υγρό από τη μήτρα προς τις σάλπιγγες, λαμβάνονται 2-4 ακτινογραφίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φανεί με μία σχετική αξιοπιστία, κατά πόσο οι σάλπιγγες είναι διαβατές ή αν έχουν κάποια σοβαρή ανωμαλία. Επίσης, φαίνεται το σχήμα της κοιλότητας της μήτρας και η ύπαρξη τυχόν ανωμαλιών στο εσωτερικό της μήτρας όπως διάφραγμα, πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις. Η υστεροσαλπιγγογραφία δεν είναι κατάλληλη εξέταση για την κατάσταση των ωοθηκών ή για τη διάγνωση της ενδομητρίωσης.

- A: Η συσκευή με την οποία εγχέεται το υγρό μέσα στη μήτρα.
B: Το υγρό περνά μέσα από τη μήτρα και στη συνέχεια
C: περνά μέσα από τις σάλπιγγες εφόσον είναι ανοιχτές*





Φυσιολογική υστεροσαλπιγγογραφία

Τι πρέπει να ξέρω πριν από την εξέταση;

Η καλύτερη χρονική στιγμή για την εξέταση είναι οι 10 πρώτες μέρες του κύκλου (αφού έχει σταματήσει η αιμορραγία), προκειμένου να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να είναι η γυναίκα έγκυος όταν κάνει την εξέταση. Αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης, η γυναίκα μπορεί επιστρέψει στις καθημερινές της ασχολίες.

Η εξέταση γενικά είναι καλά ανεκτή, αν και πολλές γυναίκες μπορεί να νιώσουν κάτι ανάλογο με τους «πόνους περιόδου» κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή και για κάποιες ώρες μετά. Κάποιες γυναίκες μπορεί να νιώσουν μόνο ένα στιγμιαίο πόνο τη στιγμή που το υγρό περνάει μέσα στη μήτρα. Σε αυτή την περίπτωση χορηγούνται απλά αναλγητικά. Στο «γέννημα» προτείνουμε την προληπτική χορήγηση ενός συνδυασμού παυσίπονων (Ponstan, Buscopan) 1-2 ώρες πριν την εξέταση, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη.

Τι συμβαίνει μετά την εξέταση;

Μετά την υστεροσαλπιγγογραφία και για 1-2 μέρες μετά, η γυναίκα μπορεί να έχει ελάχιστη ποσότητα αίματος. Αυτό είναι αναμενόμενο και δεν πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, παρά μόνον αν η αιμορραγία είναι έντονη. Τότε χρειάζεται να επικοινωνήσει με το γιατρό της. Για προληπτικούς λόγους, μετά την υστεροσαλπιγγογραφία στην ασθενή χορηγείται αντιβιοτικό για 7 μέρες (Vibramycin ή Rulid 2 φορές την ημέρα).

Είναι ασφαλής η υστεροσαλπιγγογραφία;

Η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται η γυναίκα κατά τη διάρκεια της υστεροσαλπιγγογραφίας είναι ελάχιστη και έχει αποδειχθεί πως δεν προκαλεί προβλήματα στα έμβρυα, ακόμα και αν η γυναίκα μείνει έγκυος αμέσως μετά την εξέταση (τον ίδιο μήνα). Σε σπάνιες περιπτώσεις, το σκιαγραφικό υλικό που χρησιμοποιείται στην εξέταση μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στη γυναίκα. Η ασθενής θα πρέπει να ενημερώνει τον γιατρό αν γνωρίζει ότι είναι αλλεργική στα σκιαγραφικά υλικά (π.χ. από προηγούμενη εξέταση). Αν μετά την εξέταση η γυναίκα νιώσει κνησμό (φαγούρα), πρήξιμο ή εμφανισθεί εξάνθημα (δηλαδή σημεία αλλεργικής αντίδρασης), τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον γιατρό της.

Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι μια ιδιαίτερα ασφαλής εξέταση. Όμως σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν επιπλοκές, όπως η λοίμωξη στην κύελο. Αυτό συνήθως προκύπτει αν υπάρχει προηγούμενη λοίμωξη των σαλπίγγων. Αν 1 ή 2 μέρες πριν την εξέταση η γυναίκα αισθάνεται αυξανόμενο πόνο στην περιοχή ή αν έχει πυρετό, θα πρέπει να ενημερώσει τον γιατρό της.





M. ΠΙΣΤΟΛΗ Α.Ε.

Η πρώτη επιλογή...

...στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή	...στη μειωτική	...στη γυναικολογία	...στη παιδιατρική	...στην ενδοκρινολογία
Menopur™ menotropin	Tractocile atoban	Gonapeptyl Depot triptorelin Acetate	BioGaia® Προβιοτικές σταγόνες	Zomacton® Somatotropin
Bravelle® urofollitropin	Propess	Norprolac® quinagolide	Minirin MELT 60/120 ₁₉	Minirin MELT 60/120 ₁₉

Ferring Ελλάς Α.Ε. Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210 68 43 449, fax: 210 6844721 • www.ferring.com

"Το Κέντρο Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής «γέννημα» δεν έχει καμία συνεργασία με την εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία. Η συγκεκριμένη καταχώρηση σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι το «γέννημα» εγγυάται την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των σκευασμάτων της."

φροντίζουμε για την επιτυχία
της προσπάθειάς σας



ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

γέννημα

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 346 - 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 6830311 • FAX: 210 6830321
e-mail: info@gennima.gr • www.gennima.gr